

მოხმარების ინსტრუქცია: ინფორმაცია მოხმარებლებისთვის

ცინკიტი® 10 შუშუნა ტაბლეტი

ZINKIT®

აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H₂O 44მგ

შეესაბამება 10მგ თუთიას

მედიკამენტის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით მოხმარების ინსტრუქციას, რადგან ის მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს. ეს პრეპარატი გაიცემა ურეცეპტოდ. მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი უნდა მიიღოთ დანიშნულებისამებრ.

- შეინახეთ ინსტრუქცია, შესაძლებელია კიდევ დაგჭირდეთ მისი წაკითხვა.
- დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.
- თუ სიმპტომები გაგიუარესდათ ან არ გაგიუმჯობესდათ, მიმართეთ ექიმს.
- თუ აღნიშნული გვერდითი მოვლენებიდან თქვენზე რომელიმე გამოვლინდება ან შეამჩნევთ ისეთ გვერდით მოვლენას, რომელიც არ არის აღწერილი ინსტრუქციაში, შეატყობინეთ ექიმს ან ფარმაცევტს. იხ. თავი 4

მოხმარების ინსტრუქციამოიცავს შემდეგინფორმაციას:

1. რას წარმოადგენს ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი და რისთვის გამოიყენება ის?
2. რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღების წინ?
3. როგორ გამოიყენება ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი?
4. რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი?
5. როგორ შევინახოთ ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი?
6. დამატებითი ინფორმაცია

1. რას წარმოადგენს ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი და რისთვის გამოიყენება ის?

ცინკიტი არის თუთიის შემცველი პრეპარატი

მოხმარების სფერო

კლინიკურად დადასტურებული თუთიის ნაკლებობა, როდესაც საკვების სახით ვერ იღებთ საკმარის რაოდენობას.

2. რა უნდა გაითვალისწინოთ ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღებამდე?

ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღება არ შეიძლება:

- თუ თქვენ ჰიპერმგრძობიარე (ალერგიული) ხართ თუთიის სულფატის ა ცინკიტის სხვა დამხმარე კომპონენტების მიმართ.

განსაკუთრებულსიმფრთხილე ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღებამდე:

არ არის საჭირო განსაკუთრებული ზომების მიღება.

ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღება სხვა პრეპარატებთან ერთად

აღნობეთ ექიმს თუ იღებდით ან იღებთ სხვა რაიმე პრეპარატს, თუნდაც არარეცეპტულს.

რომელი სხვა პრეპარატები ახდენს გავლენას ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მოქმედებაზე?

ხელატს აგენტები, როგორცაა დ-პენიცილამინი, დიმერკაპტოპროპანსულფონის მჟავა (DMPS), ეთანდიკარბონის (DMSA) მჟავა ან ეთილენის მმარმჟავა (EDTA), აფერხებენ თუთიის აბსორბციას ან ზრდის მის გამოყოფას. თუთიის და ფოსფატის, თუთიის, სპილენძის და კალციუმის მარილის ერთდროული მიღება აფერხებს თუთიის შეწოვას. თუთია აფერხებს სპილენძის აბსორბციას. დიდი რაოდენობის თუთია აფერხებს რკინის შეწოვას და შენარჩუნებას. თუთია აფერხებს ტეტრაციკლინის, ოფლოქსაცინის და სხვა ქინოლონების (მაგ. ნორფლოქსაცინი, ციპროფლოქსაცინი) შეწოვას. აქედან გამომდინარე თუთიისა და ზემოხსენებული მედიკამენტების მიღებებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს მინიმუმ 3 საათი.

ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღება სასმელთან და საკვებთან ერთად

ფიტინის დიდი შემცველობის საკვები (ბურღულეული, პარკოსანი, თხილეული) ხელს უშლის თუთიის შეწოვას. არსებობს ეჭვი, რომ ყავა აფერხებს თუთიის აბსორბციას.

რომელ სხვა პრეპარატებზე ახდენს ზემოქმედებას ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი?

თუთია აფერხებს სპილენძის აბსორბციას.

ორსულობა და ლაქტაცია

ნებისმიერი პრეპარატის მიღებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან ან ფარმაცევტთან.

პრეპარატის მიღება ორსულებისთვის დასაშვებია მხოლოდ თუთიის ნაკლებობის დადასტურების შემთხვევაში.

კონცენტრაცია და მანქანის მართვა:

არ არის არავითარი ინფორმაცია, მოქმედებს თუ არა პრეპარატი კონცენტრაციაზე და მანქანის მართვაზე ან დანადგარებთან მუშაობაზე.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის დამხმარე ნივთიერებების შესახებ

ეს პრეპარატი შეიცავს სორბიტოლს. თუ თქვენთვის ცნობილია, რომ შაქრის რომელიმე სახეობის მიმართ გაქვთ აუტანლობა, ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან.

3. ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის მიღების წესი

ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი მიიღეთ ანოტაციის თანახმად ან ექიმის დანიშნულებისამებრ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

თუ ექიმისგან სხვაგვარად არ გაქვთ დანიშნული, რეკომენდირებული დოზა შეადგენს:

1 შუშუნა ტაბლეტი გახსენით წყალში და მიიღეთ დღეში 1-2ჯერ (შეესაბამება 10-20მგ თუთიას).

შპს ვიორვაგ ფარმა

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG

კალვერ შტრასე 7

71034 ბიობლინგენი

მიღების ფორმა

პრეპარატის მიღება ხდება უზმოზე, ჭამამდე გარკვეული დროით ადრე წყალში გახსნილი.

მიღების ხანგრძლივობა

მიღების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია მკურნალობის მიმდინარეობაზე.

მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი ძლიერად ან სუსტად მოქმედებს.

თუ მიიღეთ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტი ჭარბი დოზით, ვიდრე რეკომენდირებულია:

ჭარბი დოზის მიღების შემთხვევაში პირში წარმოიქმნება მეტალის გემო, ვლინდება თავის ტკივილი, სისუსტე, გულისრევა და ღებინება. რეკომენდირებულია დაუყოვნებლივ კუჭის გამორეცხვა. დიდი რაოდენობით რძის მიღება. თუ სიმპტომები არ გადაგივლით, მიმართეთ ექიმს.

თუ დაგავიწყდათ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღება:

გააგრძელეთ მიღება დანიშნულებისამებრ.

თუ შეწყვიტავთ ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებას:

პრეპარატის მიღების ან მკურნალობის დროზე ადრე შეწყვეტისთვის არ არის განსაკუთრებული ღონისძიებები საჭირო. მკურნალობის საუკეთესო შედეგის მისაღწევად, რეკომენდირებულია აცნობოთ ექიმს, თუ აპირებთ მკურნალობის დროზე ადრე შეწყვეტას.

4. რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი?

სხვა პრეპარატების მსგავსად, ამ პრეპარატსაც გააჩნია გვერდითი მოვლენები, რომლებიც ყველა პაციენტში არ ვლინდება.

გვერდითი მოვლენები წარმოდგენილია მისი გამოვლენის სიხშირის მიხედვით:

ძალიან ხშირად ($\geq 1/10$)

ხშირად ($\geq 1/100$ - $< 1/100$ -მდე)

შედარებით იშვიათად ($\leq 1/1,000$ - $< 1/100$ -მდე)

იშვიათად ($\geq 1/10,000$ - $> 1/1,000$)

ძალიან იშვიათად ($< 1/10,000$)

არ არის ცნობილი (წარმოდგენილი მონაცემების საფუძველზე არ არის სიხშირე დადგენილი)

შესაძლო გვერდითი მოვლენები:

კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადება

ძალიან იშვიათად ცინკიტი 10 შუშხუნა ტაბლეტის მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჩივილები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში, მაგალითად: მუცლის ტკივილი, გულისრევა, ღებინება, დიარეა და კუჭის გაღიზიანება. ეს ჩივილები ძირითადად ვლინდება მკურნალობის საწყის ეტაპზე და უფრო ხშირად უზომოზე მიღების შემთხვევაში, ვიდრე ჭამის დროს მიღებისას.

ასეთ შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოწვავთ სახით პრეპარატი მიიღოთ ჭამის დროს, მაგრამ არა მცენარეულ საკვებთან ერთად (იხ. „პრეპარატის მიღება საკვებთან და სასმელთან ერთად“).

ხანგრძლივი მიღების შემთხვევაში თუთიამ შეიძლება გამოიწვიოს სპილენძის ნაკლებობა.

გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინება

გვერდითი მოვლენების შემჩნევის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ექიმს მიმართეთ აგრეთვე იმ შემთხვევაშიც, თუ შეამჩნევთ ისეთ სიმპტომებს, რაც ანოტაციაში არ არის მითითებული. გვერდითი მოვლენების შესახებ შეგიძლიათ განაცხადი გააკეთოთ მედიკამენტებისა და სამედიცინო პროდუქტის ფედერალურ სამსახურში, ფარმაკოვიგილანცის განყოფილებაში

კურტ-გეორგ-კისინგერის ხეივანი 3,

53175 ბონი, გერმანია,

ვებგვერდი: www.bfarm.de

ამით თქვენ დაეხმარებით გვერდითი მოვლენების შესახებ მეტი ინფორმაციის მოძიებას.

5. ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის შენახვის პირობები

შეინახეთ პრეპარატი ბავშვებისგან დაცულ ადგილას.

არ გამოიყენოთ პრეპარატი შეფუთვაზე და ტუბზე მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ.

შენახვის პირობები:

ტუბს მაგრად დაახურეთ თავი და შეინახეთ მშრალ ადგილას.

6. დამატებითი ინფორმაცია

რას შეიცავს ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი:

აქტიური ნივთიერება: 1 შუშუნა ტაბლეტი შეიცავს:

თუთიის სულფატი * 7H₂O 44მგ

(შეესაბამება 10მგ, 0.15 mmol შესაბამისად 0,30 mval თუთიას)

დამხმარე ნივთიერებებია: ლიმონმჟავა, ნატრიუმის ჰიდროგენკარბონატი, სორბიტოლი,

ნატრიუმის ციკლამატი, პასიფლორა-არომატიზატორი, ნატრიუმის საქარინი

ცინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტის გარეგნული ფორმა და შეფუთვის შიგთავსი:

შეფუთვაშია 20 შუშუნა ტაბლეტი (N1), 40 შუშუნა ტაბლეტი (N2), ნაკრები შეფუთვის

სახით (2x20 შუშუნა ტაბლეტი), 100 შუშუნა ტაბლეტი (N3), ნაკრები შეფუთვის სახით (5x20

შუშუნა ტაბლეტი).

ფარმაცევტული კომპანია და მწარმოებელი:

შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი

ტელ.: 7031/6204-0, ფაქსი: 7031/6204-31

ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.de

მწარმოებელი

შპს დოქ. შეფლერ ნახტ Dr. Scheffler Nacht. GmbH & Co.GK

ზენეფელდერშტრასე 44, 51469 ბერგიმ გლადბახ

წინამდებარე ანოტაცია უკანასკნელად შესწორდა 2014 წლის ივნისში.

ინფორმაცია ჩვენი პაციენტებისთვის:

თუთია არის მნიშვნელოვანი მიკროელემენტი, რომელსაც ჩვენი ორგანიზმი გარე ფაქტორების დახმარებით იღებს, რადგან ჩვენი ორგანიზმი მას ვერ გამოიმუშავებს. თუთია არის რკინის შემდეგ მეორე ყველაზე ხშირი მიკროელემენტი ადამიანის ორგანიზმში. ჩვენი სხეულის ყოველი უჯრედი შეიცავს თუთიას. ის წარმოდგენილია, როგორც პროტეინების და ნუკლეინის მჟავას და ჰორმონების შემადგენელი ნაწილი. აქედან გამომდინარე ის ვლინდება ბევრ ბიოკატალიზატორში (ფერმენტი) და მონაწილეობს მრავალ ცენტრალურ ნივთიერებათა ცვლის პროცესში. ორგანიზმის მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც თუთიის გარეშე ვერ ან არასრულფასოვნად განხორციელდება, არის უჯრედების დაყოფა და ზრდა, ასევე ჩვენი სხეულის იმუნური დაცვა. თუთიის ნაკლებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს არასაკმარისი მიწოდებით ან არასწორით კვებით, ასევე მარხვის დროს არანორმირებული კვებით. თუთიის ნაკლებობა შეიძლება გამოწვეული იყოს აგრეთვე თუთიის აბსორბციის დარღვევით (მაგ. ნაწლავური დაავადება) ან თუთიის ჭარბი გამოყოფით.

შპს ვიორვაგ ფარმა

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG

კალვერ შტრასე 7

71034 ბიობლინგენი

20 შუშუნა ტაბლეტი (N1) მიიღება ორალურად წყალში გახსნილი ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტები აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H ₂ O 44მგ (შეესაბამება 10მგ თუთიას)		ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი ვარგისია:
73x36x95მმ PC 429	თუთიის ნაკლებობის სამკურნალო საშუალება შემადგენლობა: 1 შუშუნა ტაბლეტი შეიცავს: აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H ₂ O 44მგ (შეესაბამება 10მგ, 0.15 mmol შესაბამისად 0,30 mval თუთიას) შეიცავს სორბიტოლს, ყურადღებით გაეცანით ანოტაციას PLZ-04570562	VNr.-17-0807-21 500797
ზინკიტი 10 შუშუნა ტაბლეტი შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.de		20 შუშუნა ტაბლეტი (N1) მიიღება ორალურად წყალში გახსნილი აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H ₂ O 44მგ (შეესაბამება 10მგ თუთიას) თუთიის ნაკლებობის სამკურნალო საშუალება

გაიცემა ავთიაქებში.
ტუბს თავი მაგრად დაახურეთ და შეინახეთ მშრალ ადგილას!
შეინახეთ ბავშვებისგან დაცულ ადგილას!
ყურადღებით გაეცანით ანოტაციას!
ლიც.# 8207.01.00

მომხმარებელი: შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG

პროდუქტი: ზინკიტი 10

20 შუმზუნა ტაბლეტი

ქვეყანა: გერმანია

ფორმატი: 73X36 X 95მმ - შეფლერ

ფერი: შავი

HKS 13 წითელი (=პანტონი 485)

KN 996 (ლურჯი)

ფორმატი 29.1 Ø (91.4**) X85მმ ტუბი: R 179 AWG

**საბეჭდი და ტექნიკური მიზეზების გამო შეფუთვის ეს ფორმატი შეზღუდულია

შეფუთვა და საფარი = 90.1მმ

შეფუთვა და საფარი = 91.1მმ

შეფუთვა და საფარი = 85.1მმ

10 შუმზუნა ტაბლეტი (N1) მიიღება ორალურად წყალში გახსნილი

ზინკიტი 10 შუმზუნა ტაბლეტები

აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H₂O 44მგ

(შეესაბამება 10მგ თუთიას)

თუთიის ნაკლებობის სამკურნალო საშუალება

თუ სხვაგვარად არ გაქვთ დანიშნული, მიიღეთ:

1 შუმზუნა ტაბლეტი გახსენით წყალში და მიიღეთ დღეში 1-2ჯერ.

ტუბს თავი მაგრად დაახურეთ და შეინახეთ მშრალ ადგილას!

შეინახეთ ბავშვებისგან დაცულ ადგილას!

შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი

ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.de

ვარგისიანობის ვადა იხილეთ ტუბის ძირზე

შემადგენლობა:

1 შუმზუნა ტაბლეტი შეიცავს: აქტიური ნივთიერება: თუთიის სულფატი * 7H₂O 44მგ

(შეესაბამება 10მგ, 0.15 mmol შესაბამისად 0,30 mval თუთიას)

შეიცავს სორბიტოლს, ყურადღებით გაეცანით ანოტაციას

ლიც.# 8207.01.00

გაიცემა ავთიაქებში

დასაბეჭდი ტექსტის სიმაღლე = 71.0მმ

ტუბის სიგრძე = 85.0მმ

ტექსტის და/ან ილუსტრაციის დასაბეჭდი ფართობი.

დაშორება მარცხნივ 3მმ დაშორება მარჯვნივ: 2მმ

AWG გარე პირი დაცული საკეთით

SW სპეციალური პირი

KS ბავშვებისთვის უსაფრთხო

მომხმარებელი: შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG

პროდუქტი: ზინკიტი 10

ტუბი

ქვეყანა: გერმანია/RO

ფორმატი: Ø 29.1 (91.4) X85მმ - შეფლერ

ფერი: შავი

HKS 13 წითელი (=პანტონი 485)

KN 996 (ლურჯი)

მდგომარეობა: 31.01.2013/04.02.2013/11.06.2013/12.06.2013

შპს ვიორვაგ ფარმა

WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG

კალვერ შტრასე 7

71034 ბიობლინგენი

გადავთარგმნე: